

衛

生

寶

鑑

南齊書鑑卷之十七

各方類集

○腸風痔漏門

腸風痔漏論

腸風痔漏總辭也分之則異若破者謂之痔漏大便秘澀必作大痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也故經曰因而飽食筋脉橫解腸澀為痔也受病者燥氣也為病者胃熱也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是溫熱風燥四氣相合故大腸頭成塊者溫也作大痛者風也大便秘結者主病兼受火邪熱盛也去此四者其西方肺主諸氣其肺收下亦助病為邪須當以破氣藥蒸之治法全矣不可作丸以水煎服之效如神速

秦亮蒼木湯主之

秦亮 一錢去分

澤瀉 二分

當歸身 三分酒浸

蒼木 七分

防風

半錢

大黃

少許雖大便燥不可多加

枳椇

一分為末

桃仁

湯浸去皮一錢半

皂角仁

燒存性去皮一錢為末

黃蘗

去皮四分酒洗若大腸頭沉重濕勝也以及意加之天氣或大熱亦以意加之或病除執喜寒亦加之

右十味咬咀和勻都作一服水五錢煎至一錢二分去粗

入桃仁枳椇皂角仁再上火煎至一錢去粗空心溫服待

少時以羹餠壓之不犯胃也服日忌生冷硬物酒麵等大

料物之類犯之其藥無效如有白膿加白葵花五朶去心

萸細剪青皮半錢不去白入正鹽中同煎又入木香末半

錢同皂角等末同入依上法服若病大者再服而愈

七聖丸治大腸疼痛不可忍

方在大便門中

乳香丸治諸痔下血肛邊生肉或結核腫疼或生瘡痒痛或大便

艱難肛腸脫出又治腸風下血無問新久及諸癰根在臟腑者

能治之

枳殼 去穢麩炒

牡蠣 火煨

華澄茄

大黃 蒸焙

鶴

虱 炒

芫青 去頭翅足糯米炒  
米黃色各半及

乳香 所

白丁香 研各一

右為末粟米糊丸如梧桐子大每服十九至十五丸如治

腸風膿血清下諸痔煎薤白湯下諸瘻煎鐵屑湯下並食

前服

神應黑玉膏治丈夫婦人久新腸風痔漏大腸頭疼不可忍服此

藥不過三四次便效初得此疾發痒或疼穀道周廻多生硬核

此是痔破即成漏只下血腸風皆因酒色風氣食五辛過度即

成此疾人多以外科塗治不知病在腸自有藥若不去根本此

病不除此藥的有神効

猪鬃蹄 二十箇

刺蝟皮 一兩一錢

牛角腮 剉炒一兩二錢

敗撥劉銀

亂髮洗淨焙

槐角各六錢

苦練根五錢

雷丸

脂麻

各四錢

右九味剉碎用瓷罐內燒存性細末入乳香二兩麝香八錢研令勻酒麵糊丸如桐子大每服八九先嚼胡桃一箇以溫酒吞下早晚腹空時日二服甚者三服切忌別藥不  
過三日除根

釣腸丸治久新諸痔肛邊腫痛或生瘡痒時有膿血又治腸風下血及肛門脫出並宜服之

括萎

二枚燒存性

蟬皮

兩箇剉碎罐內燒存性

鷄冠花

劉徹炒五兩

白礬

微枯

綠礬

和

胡桃

取仁一十五分不油者以罐內

燒存性

枳殼

去穢炒

附子

天皮斷生用

白附子生

訶子

煨去核

半夏

天南星

各二兩

右為細末以醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸  
心臨卧溫酒下遠年不瘥者服十日見效久服永除根若  
小則腸風等疾一二年內者只十服瘥永不發動

淋瀝藥治腸風痔漏經久不瘥瘡口膿汁不絕及瘡內有虫痒痛  
不止宜此淋洗之

商艮 靈仙 去土 荆芥穗 去土 乳香 各二兩

鳳眼草 二兩 細辛 去皮二錢半

右六味為粗末每用三兩水一大碗煎至一升去粗稍熱  
洗患處必再溫熱更洗一遍不用洗罷用軟帛揩乾上藥  
如瘡破後不須上藥只淋洗之

淋瀝地榆散治肛門痒痛或腫

地榆 荆芥 苦參 蛇床子 各等分

右為粗末每用一匙水一碗煎二三沸去粗避風處通手  
熱洗患處

財味雞冠散治五痔肛邊腫痛或鼠乳或穿穴或作瘡久而不愈  
變成漏瘡

雞冠花

鳳眼草

各一两

右為粗末每用粗末半兩水碗半煎三五沸熱洗患處

結陰丹治腸風臟毒下血諸大便血疾

已下三方傳之於諸路醫  
李振幸忽忘用之甚效

枳殼

炙炒

黃芪

歲靈仙

陳皮

去白

何首烏

荆芥穗

椿根白皮

各等分

右七味為末酒糊丸如桐子大每服五十丸至七十丸陳  
米飲入醋少許再煎一二沸放溫送下平明服之空腹服  
之亦妙

淋淋或鹽仙散治痔漏大腸頭疼痛或腫痛

枳殼炙 靈仙等分

右粗末每用一兩水一碗半煎至一碗去粗重洗冷再暖  
避風洗三次軟帛拭乾傳蒲黃散

蒲黃散治下部痔漏

蒲黃一兩 血竭半兩

右為細末每用少許貼患處

椿皮散專治血痢及腸風下血此方李舜卿教授傳用有驗

椿白皮三兩 槐角子四兩 明白礬二兩 甘草一兩半

右為末每服參錢熱米飲調下神驗不傳

○大使門

約九跌陽脉浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便



則雞其脾為約麻仁丸主之

芍藥

半斤

枳實

半斤

麻子仁

二升

大黃

一斤去皮

厚朴

一斤炙去皮

杏仁

一斤去皮尖熬

右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十九日二服漸加

利為度

潤

腸九治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥不通全不思食此乃風

結秘血結秘皆令閉塞而不通也風以潤之血以和之和血疎

風自然通矣

桃仁

湯浸去皮

羌活

大黃

煨

當歸

各半兩

麻子

仁

半升

右以桃仁麻仁研如泥入羅末藥勻煉蜜丸如桐子大每服伍十九至百九空心白湯送下以通為度如不通而澀

其榮盛者急加酒洗大黃以利之

如血澁而大便燥者加桃仁酒洗大黃

如風結燥大便不行者加麻仁大黃

如風澁大便不行者加皂角仁大黃秦朮以利之

如脉澁覺身有氣澁而大便不通者加郁李仁大黃以除

氣澁

當歸潤燥湯

升麻

生地黄

各二錢

麻子仁

研如泥

當歸

熟

地黃

生甘草

桃仁

泥子研

大黃

煨各一錢

紅

花半分

右吹咀入研藥都作一服水二錢煎一服去粗空心宿食

消盡稍熱服之

犀角丸治三焦邪熱一切風氣又治風盛痰實頭目重肢體拘急

腸胃燥澀大小便難

犀角

鎚末

黃連

各一兩

人參

二兩

大黃

八兩

黑牽

各二十兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸至二十九臨卧溫

水下量虛實加減

七宣丸療風氣結聚宿食不消若砂石皮吃在腹中及積年腰脚  
疼痛冷如冰石脚氣衝心煩憤頭旋暗倒有背重心腹脹滿胸  
腫痞塞及風毒連頭面腫大便或秘小便時澀脾胃虛痞不食  
脚轉筋攣急掣痛心神恍惚眠寐不安

桃仁

去皮尖炒六兩

柴胡

去筋

呵子皮

枳實

麩炒

木香

各五錢

甘草

炙四兩

大黃

剉裹綿十五兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九米飲下食前臨臥  
各一服以利為度覺病勢退服五補丸此藥不問男女老  
幼皆可服量虛實加減丸數

七聖丸治風氣壅盛痰聚結搏頭目昏暈嘔噦稠粘心煩面熱咽  
乾口燥有背拘急心腹脇肋脹滿腰腿重疼大便難小便赤睡  
卧不安

肉桂

去皮

川芎

大黃

酒蒸

檳榔

木香

各半兩

羌活

一兩

郁李仁

去皮一兩

右七味為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸溫水送下食  
後山嵐瘴地最宜服虛實加減之

潤腸積古丸此二味降氣潤腸服之大腸自無澀滯久服不損胃  
氣

杏仁

去皮尖麤炒

橘皮

等分

右為末煉蜜九桐子大每服五十九空溫水下

麻仁丸順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱壅結津液耗散令

人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱及有風人大便秘澀尤

宜服之

枳殼

去穢麤炒

白枚榔

煨半生

兔絲子

酒浸別末

山黃

防風

去叉枝

山茱萸

肉桂

去粗皮

車前

子

各一兩半

木香

羌活

各一兩

郁李仁

去皮另研

大黃

半生半生

麻仁

別為所各四兩

右為細末入別研藥勻煉蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸至二十九溫水下臨卧服之

神功丸治三焦氣壅心腹痞悶臟腑風熱大便不通腰腿疼痛

背重疼頭昏面熱口苦舌乾心胸煩躁睡卧不安及治脚氣并  
素有風人大便結燥

火麻仁

另傳如膏

人參

各二兩

訶梨勒皮

大黃

者麝最畏  
各四兩

右為細末入麻仁搗研勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二  
十丸溫水下溫酒米飲皆可服食後臨卧如大便不通可  
倍丸數以利為度

師曰凡臟腑之秘不可一槩治之有虛秘有實秘胃實而秘者能  
食而小便赤當以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛而秘者不能食  
而小便清利宜以

厚朴湯

白朮

五兩

厚朴

薑製

陳皮

去白

甘草

炙各三兩

枳

實

半夏 各二兩

右為粗末每服三錢水一觥半薑三片棗二箇煎至八分去粗大溫服食前

○夫胃氣實者秘物也胃氣虛者秘氣也

蜜導前陽明病自汗出若發汗小便自利此為津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜導煎而通之及土瓜根與猪膽汁皆可為導

蜜一味熬欲凝丸如指大長二寸頭銳易納穀道中欲大便時去之

半硫丸除積冷暖五藏溫脾胃進飲食治心腹一切痼癖冷氣及年高風秘冷秘或泄瀉等並皆治之

半夏

湯洗七次焙乾為細末

硫黃

明淨者研令極細用

右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼內杵數百下丸如梧桐子大每服空心溫酒或生薑湯下十五丸至二十丸婦人醋湯下

胞痺門

治小便不利并澀附

痺論云胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃以湯澁於小便上為清涕夫膀胱者為州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒溫邪氣客於胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其證小腹膀胱按之內痛若沃以湯澁於小便以足太陽經其直行者上交巔入絡腦下灌鼻竅則清澁也治胞痺小便不利腎著湯千金方內同茯苓丸治胞痺脘腹脹痛小便不行

防風

去芦

細辛

去苗

赤茯苓

去皮

白朮

附子

澤瀉

官桂

各半兩

紫苑

瓜蒌根

牛膝

酒浸



黃芪

芍藥

甘草

炙各三分

山芋

生地黄

半夏

湯泡

獨活

山茱萸

各一分

前

巴戟丸治胞痺脘腹痛小便不利

巴戟

兩半去心

遠志

去心

桑螵蛸

熬炒黑

山芋

附子

炮

生地黄

續斷

各一兩

杜仲

炙

兔絲子

酒浸

石斛

鹿茸

酥炙

五味子

龍骨

官桂

山

茱萸

各二錢

肉蓯蓉

酒浸一兩

右十六味為末煉蜜丸如桐子大每服三十九溫酒送下

空心食前服之

此方治胞痺小腹急小便不利

杜仲 炒去絲

桑白皮

犀角屑

木通

五加皮

麥門冬 去心

桔梗 各一兩

赤芍藥 五兩

右八味粗末每服五錢水一觔半羊腎一箇切竹瀝少許

同煎溫服

八正散治大人小兒心經邪火一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心

忪面熱煩躁不寧目赤睛赤唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又  
治小便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋並宜服之

瞿麥

蒲蓄

車前子

滑石

甘草 炙

山梔

子仁

木通

大黃

鹽裹煨去麩切焙各一片

右為散每服二錢水一觔入燈心煎至七分去粗溫服食  
後臨卧小兒量力少上與之

石葦散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起數尿

腹急痛者作有時勞倦即發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥

白朮

滑石

葵子

瞿麥

各二兩

石膏

去毛

木通

各二兩

當歸

去芦

甘草

炙

王不留

行各一兩

右為細末每服二錢煎小麥湯調下食前日二三服

白花散治膀胱有熱小便不通

申頤卿傳

朴硝

不以多少

右為末每服二錢用茴香湯調下食前

良法治小便不通諸藥不效或轉胞至死危困此法用之小便自出而愈用猪尿胞一箇底頭出一小眼子翎筒通針放在眼兒內根底以細線繫定翎筒子口細杖子覘定上用黃蠟封尿胞

口吹滿氣七分繫定了再用手捻定銅筒根頭放了黃蠟其  
銅筒放在小便出裏頭放開銅筒根頭手捻其氣透於裏小便  
即出大有神効

黃芩清肺湯治因肺燥而得之小便不通

黃芩

二錢

梔子

二箇

右作一服水一觥半煎至七分去粗溫服食后不利加鹽  
豉二十粒

滋陰化氣湯治因服熱藥過多小便不利或臍下悶痛不可忍服  
諸藥不効者

黃連

炒

黃蘗

炒

甘草

炙各等分

如書不通者加知母

右咬咀每服三錢水一觥煎至一觥去粗溫服食前

論曰問此如何得利答曰無陽者陰無以生無陰者陽無以化又云膀胱者津液之府氣化則能出焉因服熱藥過度乃亡陰也二藥助陰使氣符化故小便得以通也或以滋腎丸服之其效更速紅林散治小便不通上喘張文叔傳大妙

龍蓄 一兩半

燈草 一百根

紅林黍根 二兩

食前

右吹咀每服五錢用河水二瓶煎至七分去粗熱服空心

立效散治下焦結熱小便黃赤淋閉疼痛或有血出及大小便俱出血者亦宜服之

其草 炙三分

山梔子

去皮炒半兩

瞿麥穗

一兩

右為末每服五錢至七錢水一碗入連須葱根七筒灯心五十莖生薑五七片同煎至七分時上溫服不拘時候

海金砂散治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或五種淋疾癃閉不通

木通

海金砂研

滑石

通草

瞿麥穗

各一兩

杏仁

去皮尖炒一兩

右六味為末每服五錢水一觔半灯心草二十莖煎至七分去粗溫服食前

琥珀散治五種淋瀝疼痛小便有膿血出

琥珀

一兩研

沒藥

一兩研

海金砂

一兩研

蒲黃

一兩研

右四味為末每服三錢食前煎薑根湯調下日進二服  
黃花散治小便淋瀝經驗

右以葵花根一握洗淨剉水煎五七沸服治小便淋瀝經

驗如神

灸法

治小便淋澀不通，用食鹽不以多少炒熟，放溫填臍中，却以艾灸七壯，小便自出，艾炷如筋頭大。

○淋痛治驗

參苓琥珀湯中統三年六月中黃明之小便淋莖中痛不可忍，相引脇下痛，制此服之大效。

人參

五分

茯苓

去皮四分

川練子

去核剉炒一錢

琥

珀

三分

生甘草

一錢

玄胡索

七分

澤瀉

柴胡

各三分

當歸

稍三分

右九味咬咀都作一服用，長流水三觔煎至一觔，去粗溫服，空心食前。

水芝丸治下焦真氣虛弱，小便頻多，日夜無度，此方得之於高麗。

國王

蓮實去皮不以多少先以好酒浸一二宿用猪肚一箇却將酒浸蓮實入在內用水煮熟取出將蓮實切開於火上焙乾秤用

右為末醋糊丸如雞頭大每服五十九溫酒送下空心食前小便數而欠

中書右丞

病小便數而欠日夜約去二十餘行脰腹脹

滿腰脚沉重不得安卧至元癸未季春下旬一奉

聖旨治之遂往診視脉得沉緩時上帶數嘗記小便不利者有二不可一藥而論耶若津液偏滲於腸胃大便泄瀉而小便澀少一也宜分利而已若熱搏下津液則溫熱而不行二也必滲泄則愈若脾胃氣澁不能通利水道下輸膀胱而化者三也可順氣今施



化而出也。今右丞平素膏粱溫熱內蓄，不得施化，膀胱竅澁，是以起數而見少也。非滲泄分利，則不能快利。遂處一方，名曰茯苓琥珀湯。內經曰：甘緩而淡，滲熱，搏津液內蓄，脘脹腹滿，當須緩之。泄之，必以其分為主。是用茯苓為君，滑石甘寒滑以利竅，猪苓琥珀之淡以滲泄而利水道，故用三味為臣。脾惡溫，上氣內蓄則脾氣不和，益脾勝溫必用甘為助，故以甘草白朮為佐。鹹入腎，鹹味下泄為陰，澤瀉之鹹以瀉伏水，腎惡燥，急食辛以溫之，津液不行以辛散之。桂枝味辛散溫潤燥，此為因用，故以二物為使。煎用長流耳爛水，使得助其腎氣，大作湯劑，今直達於下而急速也。兩服減半，旬日良愈。

茯苓琥珀湯下

茯苓

去皮

琥珀

白朮

各半兩

澤瀉

一兩

滑石

木猪苓半兩去皮

甘草炙

桂去皮各半

右八味為末每服五錢用長流甘瀾水煎一盞調下空心  
食前待少時以美饌壓之

衛生寶鑑之十七終

衛生寶鑑卷之十八

名方類集

婦人門

調經順氣

加減四物湯治胎前產後腹痛及月事不調或亡血去多或一  
不下婦人一切疾證

當歸

白芍

熟地黃

川芎

各二錢

右吹咀每服四錢水一錢半煎至八分去粗帶熱服無時  
日進二三服平常產婦服至三劑如虛弱者至一月止  
加減法

姪婦下血加阿膠末一錢炙棗五七片

因虛致血熱上與血搏口乾欲飲水加麥門冬三分括  
根一兩

血崩加地黃蒲黃各一兩

惡露不下腹中刺痛加當歸白芍藥各一分

因熱生風加川芎一分柴胡半兩

身熱脉躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩

秘澀加大黃半兩炒桃仁一分

滑泄加附子官桂各一分

嘔吐加人參白朮各半兩

發寒熱加乾薑芍藥牡丹皮各一分

腹脹加厚朴枳實各一分

虛煩不得眠加人參竹葉各一分

煩燥大渴加知母石膏各半兩

水停心下吐逆加猪苓茯苓防己各二分

寒熱類傷寒加人參柴胡防風各二分

婦人血積加三稜蓬朮桂乾漆炒各等分

逍遙散治血虛發熱經候不調

甘草 炙半兩

當歸

白茯苓

白朮

柴胡

白芍藥 各一兩

右剉每服二錢水一大觥燒生薑一塊切破薄切少許同

煎至七分去粗熱服不拘時候

治經湯治衝任虛損月候不調

阿膠 當歸

川芎

人參

肉桂

甘草

芍藥

牡丹皮 各二兩

半夏 二兩半

麥門冬 五兩

遠志 黃 三兩

右剉每服五錢水一觥半生薑三片煎至八分熱服空心

食前

黃芪白朮湯治婦人四肢沉重自汗上至頭際頸項而還惡風躁熱

黃芪 一兩

人參

白朮 各半兩

黃蘗 酒製

羌活

甘草

各二錢炙

柴胡

升麻 各一錢

當歸 一錢半

川芎

吳茱萸

各五分

細辛 三分

五味子 三十箇

汗出不止加黃蘗半錢腹中不快加炙甘草一錢

右十三味吟咀每服五錢水二觥生薑五片煎至一觥去

粗稍熱服食前

異方油煎散治婦人血風勞氣攻在四肢腰背疼痛嘔吐惡心不思飲食日漸瘦弱面色痿黃手脚麻痺血海冷敗

當用油浸五七文錢煎藥用

川烏頭炮去皮

白芍藥

五加皮

牡丹皮

海

相皮等分

右五味為末每服二錢水一觥油浸開通錢一文煎至六分去粗溫服日三服不拘時

活血丹治衝任不足下焦大寒臍腹疔痛月事不勻或來多不斷或過期不來或崩中去血或帶下不止面色萎黃肌肉瘦瘁肢躄沉重胸脇脹滿氣力衰乏飲食減少一切血氣虛寒並宜服之

桃仁去皮尖熱炒微黃色

虎杖

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒

當歸

杜仲

去麋皮剉炒

柏子仁

炒

附子

炮去皮膽

木香

山茱萸

去核

延胡索

安息香

各二十兩搗碎入好酒研

登清去粗以器內慢火熬成膏

乾薑炮

肉桂

去麋皮

牡丹皮

黃芪 去芦

艾葉 微炒

澤蘭葉 各二斤半

肉蓯蓉

酒浸焙

厚朴

去麋皮薑汁炙令熟二各五斤

右為細末以前安息香膏入白麵同煮作糊和丸如梧桐子大每服三十九食前以溫酒下醋湯亦得

滋

血湯治婦人血熱氣虛經候澀滯不通致使血聚肢體麻木肌

熱生瘡渾身疼痛將成勞瘵不可妄服他藥但宜以此滋養通

利

又治盜汗前滋血湯同可且觀之

馬鞭草

荊芥穗

各四兩

牡丹皮

一兩

赤芍藥

枳殼

去穢炙炒

肉桂

去麋皮

當歸

去苗炒

川芎

各二兩

右麋散每服四錢烏梅一箇水二錢煎一觥去粗食前空

心日四五服有此證服至半月或一月經脉自通百病皆

除神効



增損四物湯治婦人血積

當歸

川芎

熟地黃

芍藥

廣茂

桂

三稜

乾漆炒

右八味等分粗末每三錢水二觔煎一觔食前稍熱服

當歸丸治婦人經血不調血積證

當歸

川芎

赤芍藥

廣茂

熟地黃

京

三稜

各半兩

神麴

百草霜

各二錢半

右八味為末酒糊丸如桐子大每服三十九丸用溫水送下

食前溫酒亦得

玄胡苦練湯治臍下冷撮痛陰內大寒

甘草

炙五分

肉桂

附子

炮各三分

玄胡

苦練

子

各二分

熟地黃

一錢

右咬咀入黃蘗二分為引用都作一服水四觔煎至一觔去粗稍熱服空心食前

○師尼寡婦異乎妻妾之治

昔宋精澄療師尼寡婦別製方者蓋有謂也此二種鰥居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧又則為勞嘗讀史記倉公傳載濟北王侍人韓女病腰背痛寒熱衆醫皆為寒熱病治之不瘥倉公曰此病得之欲男子不可得也衆曰何以知欲男子不可得倉公曰脰其脉肝脉弦出寸口是以知之蓋男子以精為主婦人以血為主男子精盛以思室婦人血盛以懷胎夫肝攝血者也是厥陰肝脉弦出寸口上魚際則陰盛可知矣故知褚澄之言信有謂矣

通經丸治婦人室女月水不調疼痛或成血瘕

桂心

川烏頭

桃仁

當歸

廣茂

乾薑

炮一川椒炒出汗

大黃

青皮 去白各等分

右九味為末每一兩用四錢以米醋熬成膏如餘藥六錢入臼中杵千下可丸則丸如桐子大每服二十九粒淡醋湯送下加至三十九粒溫酒亦得一婦人血氣凝疼痛數服便効

生地黄丸許學士治一尼患惡風躄倦乍寒乍熱面赤心忪忪或

時自汗是時疫氣大行醫見其寒熱作傷寒治之用大小柴胡湯雜進數日病急召予治之診視之曰三部無寒其脉但厥陰弦長而上魚際宜服抑陰等藥治之故予製此方

生地黄 二兩

柴胡

秦艽

黃芩 各半兩

芍藥 一兩

右為細末蜜丸如桐子大每服三十九丸用烏梅湯吞下日

三服不拘時

熟地黃丸治婦人月經不調每行數日不止兼有白帶漸瘦羸  
飲食少味累年無子

熟地黃

二兩二分

山茱萸

白蕪荑

乾薑

代赭石

醋淬

白芍

炒各一兩

厚朴

薑製

白殭蚕

炒各半兩

右八味為末煉蜜丸如梧子大每服四五十九酒下食前

日叁服

○熱入血室證治并方

許學士治一婦人病傷寒已熱遇夜則見鬼狀所患六七日忽然  
昏塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人病勢危困召予視之曰  
得病之初曾值月經來不其家云經水方來而病作而經遂止得  
二日又寒熱晝雖靜而夜有鬼衆從昨日來不省人事予曰此

乃熱入血室證仲景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明暮則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室予製以小柴胡湯加生地黃三服而熱除不汗而自解矣又一婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣血藥治之數日遂成血結胸或勸用前藥予曰小柴胡用已遲不可行也無已則有一焉可刺期門而已予不能鍼請善鍼者治之如言而愈或者問熱入血室何為而成結胸也予曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行遇經水適來適斷邪氣乘虛入於血室血為邪所迫上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復入膈中則血結於胸中何以言之婦人平居水養木血養肝方木受孕則下之以為月水既姙則中畜之以養胎及已產則上壅之以為乳汁皆血一也今邪逐血併歸於肝經聚於膈中結於乳下故手觸之則痛非熱可及故當刺期門也

小柴胡加地黃湯方亦治產後惡露方求忽然斷絕活人書海蛤散亦治錄干后

柴胡 一兩一分

人參

半夏

黃芩

甘草 炙

生地黄 各七錢

右六味咬咀每服五錢水二觔生薑五片棗子一箇煎至一觔去粗溫服不拘時

海蛤散治婦人傷寒血結胸膈按之痛手不可近

海蛤

滑石

甘草 各一兩

芒硝 半兩

右為末每服二錢雞子清調下小便利血數行更與桂枝紅花湯發其汗則愈

○妊娠養血安胎

半夏茯苓湯治妊娠惡阻

陳皮

桔梗

旋覆花

人參

甘草

白芍

藥

川芎

各半兩

赤茯苓

熟地黃

各三分

半兩

一分兩

右十味剉每服五錢水一觔半生薑四片同煎至八分稍熱服食前次服茯苓丸即痰水消除便能食

茯苓丸治妊娠阻病

葛根

枳實

炒

白朮

各二兩

人參

乾薑

赤

茯苓

肉桂

陳皮

半夏

湯泡七次  
各一兩

甘草

二兩

右十味為細末蜜丸梧子大每服三十丸溫米飲空心下食前服

保安白朮散治妊娠傷寒安胎但竟頭疼發熱三二服便効

白朮

黃芩

等分新瓦上炒令香

右為末每服三錢水一觔生薑三片棗子二箇煎至七分

溫服

安胎阿膠散治妊娘傷寒

阿膠炒

桑寄生

白朮炙

人參

白茯苓

去皮等分

右為細末每服二錢煎糯米飲湯調下無時

安胎白朮散補榮衛養胎氣治妊娘宿有食冷胎瘦不長或失將

理傷胎多墮

白朮

川芎

各四分

蜀椒

炒出汗去目三分

牡蠣

煨三分

右為末每服二錢溫酒調下空心食前

吳茱萸湯治妊娘傷胎數落而不結實或冷或熱

黃芩

川芎

各一兩

甘草

炙一兩半

吳茱萸

半兩湯泡

右為末每服二錢溫酒調下空心食前忌生冷果實



前胡湯治妊娘傷寒頭疼壯熱肢節煩疼

前胡

石膏

各三分

大青

四分

黃芩

五分

知母

梔子仁

各四分

右為咬咀每服四錢水一觔半甜竹茹一塊葱白二寸煎至八分去滓溫服無時

黃龍湯治妊娘傷寒壯熱頭疼嘿七不欲飲食脇下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞傷餘熱未除

柴胡

一分

人參

甘草

炙

黃芩

各一分

右咬咀每服五錢水一觔半煎至七分去粗溫服無時

保安散治妊娘因有所傷胎動疼痛不止不可忍及血崩不止

連皮縮砂不以多少一味炒黑去皮為末二錢溫酒一觔

調下若竟腹中熱胎已安矣

立聖散治妊娠下血不止

雞肝 二个酒一升煮熟共食之大效

赤茯苓散治妊娠小便不利及水腫洒洒惡寒動轉筋痛

赤茯苓 去皮 葵子 各等分

右為末每服二錢新汲水調下無時

犀角散治妊娠婦人產前諸風熱困倦時發昏眩

揀參 犀角 川羌活 山梔 黃連 青黛

川芎 甘草 炙 香白芷 茯苓 去皮各等分

右為粗末每服五錢水一觔薑三片竹葉五七片煎至八

分去粗溫服食遠

大寧散治妊娠下痢赤白及泄瀉疼痛垂死者

黑豆

二十斤

甘草

二十斤生半炒

栗殼

二个大頭薄半斤

右為粗末作一服水一觥半生薑三片煎至七分去粗

服食前神効

火龍散

治妊娘心氣痛

艾葉末

盡炒一半

川練子

炒

茴香

炒各半兩

右為粗末每服二錢水一觥煎至七分去粗溫服不拘時

聖酒方治妊娘腰痛如折

大豆一味半兩以清酒一觥煎至七分去粗溫服食前

獨聖散治妊娘小便不通

蔓荊子為末每服二錢濃煎葱白湯調下食前日三服

萬應丸治妊娘胎動不安及產後小腹痛不可忍

知母一味去皮炒為末蜜丸如彈子大每服一九清酒

臍化下食前

難產

催生丹

麝香

別研一字

乳香

別研一分

母丁香

取末一錢

兔腦髓

臘月者去皮膜研

右拌勻以兔腦和丸如雞頭樣大陰乾用油紙窠封貼每服一九溫水下即時產下隨男左女右手中握藥丸出是

驗

榆白皮散治臨產驚動太早產時未至穢露先下致使胎胞乾燥

臨產艱難或曾因漏胎去血並宜服之

冬葵子

榆白皮

瞿麥

各一兩

木通

半兩

火麻

仁去壳

牛膝

酒浸各三分

獨勝散治難產

右六味剉每服五錢水一觥半煎至八分溫服不以時

黃葵子四十粒或棗或朱為衣無灰酒下

黃葵子炒七拾粒

研爛酒服濟君急

若也臨危難產時

免得全家俱啼泣

黑神散治產後瘀血作痛及血暈

黑豆

炒半升去皮

當歸

熟地黃

肉桂

乾薑

甘草

芍藥

蒲黃

各四兩

右八味為末每服二錢酒半觥童便半觥同煎調下急患

不拘時連進二服

下死胎

桂

二錢

麝香當門子

一箇

右同研細酒服漬更如手推下

此之水銀等藥不損血氣

。產後扶持康衛

當歸建中湯治婦人一切血氣虛損及產後勞損腹中疝痛少腹拘急痛引腰背時自汗出

當歸

四兩

肉桂

三兩

甘草

二兩

白芍藥

六兩

右四味切每服五錢水一觥半生薑五片棗一枚同煎至八分去粗熱服空心食前

芎藭湯治胎前產後一切去血過多

當歸

川芎

各等分

右剉每服五錢水一觥半煎至八分去粗熱服不拘時

犀角飲子治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口乾燥

犀角

麥門冬

去心

白朮

各半兩

柴胡

一兩

地骨

皮 枳殼 炙炒 甘草 炒 生地黃 當歸 揀參

茯苓 去皮 黃芩 黃芪 各七錢

右十三味為粗末每服三錢水一觥半浮小麥七十粒煎  
三片煎至七分去粗溫服食後

牡丹皮散治產後寒熱臍下疼痛煩躁神效

牡丹皮 地骨皮 天台烏藥 海桐皮 青皮

陳皮 各一兩

右為末入研了沒藥二錢半再羅過每服二錢水一觥煎  
至七分如寒多熱服熱多寒服食前日三服忌生冷硬滑

醋物

枳殼丸治產後大小便澁滯

木香 三錢 枳殼 炙炒 麻仁 炒黃 大黃 各一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九溫水送下食後如飯食不化亦宜服之

通和湯治婦人乳癰疼痛不可忍者

穿山甲

炮黃

川木通

各一兩剉

自然銅

半兩醋淬七次

右為末每服二錢熱酒調下食遠服之

鍼法治乳癰腫痛諸藥不能止痛者三里穴鍼入五分其痛立止如神穴在膝下胛外廉兩筋間舉足取之

湧泉散治婦人因氣瘀汁絕少

瞿麥穗

麥門冬

去心

王不留行

聚龍骨

穿山

甲

炮黃等分

右五味為末每服一錢熱酒調下後食豬蹄羹少許并藥用水梳左右乳上梳三十來梳一日三服食前服三次羹



湯投三次梳乳

勝金丹治婦人吹妳極有力

百齒霜一味今梳上髮之垢也不以多少用無根水丸如桐子大每服三丸倒流水送下食後病左乳左卧右乳右卧溫覆出汗倒流水法取水傾屋上流下是

○腸覃石痕論治并方

黃帝鍼經水脹篇云腸覃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛相搏衛氣不得滲因有所繫痕而內著惡氣乃起瘰肉乃生其始生者大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也夫腸者大腸也覃者延也大腸以傳導為事乃肺之府也肺主衛衛為氣得暖則泄得冷則凝今寒客於大腸故衛氣不滲有所繫止而結痕在內貼著其延久不已

是名腸覃也氣散則清氣聚則濁結為瘕聚所以惡氣發起瘕肉  
乃生小漸益大至期而鼓其腹則如懷子之狀也此氣病而血未  
病故月事不斷應時而下本非胎娠可以此為辨矣

晞露丸治寒傷於內氣凝不流結於腸外久為癥瘕時作疼痛腰  
不得伸

廣茂

一兩到

京三稜

一兩判並酒浸

乾漆

五錢洗去腥少烟尽

川烏

五錢

硃砂

四錢

青皮

三錢

雄黃

另研三錢

面

香

三錢鹽炒

川山甲

三錢炮

輕粉

一錢另研

麝香

半

另研

巴豆

三十箇去皮切開

右除研藥外將巴豆炒三稜廣茂二味炒黃色去巴豆不

用共為末入研藥勻生薑汁打糊丸如桐子大每服二十

丸至三十丸薑湯送下酒亦得空心食前

木香通氣散治寒氣結瘕腹大堅滿痛不可忍

木香

戎鹽炒

京三稜

炮各半兩

厚朴

一兩薑製

枳實

炙炒

甘草

炙各三錢

乾薑炮

蓬朮

炮各二錢

右八味為末每服三錢淡生薑湯調下食前

黃帝鍼經水脹篇云石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉塞使氣不通惡血當瀉而不泄則血以留止日久益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之夫膀胱為津液之府氣化則能出焉今寒客於子門則氣必塞而不通血壅而不流血以留止結硬如石是名石瘕也此病先氣病而後血病故月事不來則可宣導而下出者也難經云任之為病其苦結男子生七疝女子為瘕聚此之謂也非太辛之劑不能已也可服見脫丸

見曉丸治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕聚堅大久不消者

附子四錢炮去皮臍

黑箭羽

紫石英

各三錢

澤瀉

肉桂

玄胡索

木香

各二錢

枳殼

二錢半

血竭

一錢半另研

水蛭

一錢炒烟尽

京三稜

五錢剉

桃仁

三十箇浸去皮果麩炒研

大黃

二錢剉用酒同三稜浸一宿焙

右十三味除血竭桃仁外同為末入另研二味和勻用元

浸藥酒打糊丸如桐子大每服三十九丸淡醋湯送下食前

溫酒亦得

和血通經湯治婦人室女受寒月事不來惡血積結堅硬如石

當歸

京三稜

炮各五錢

廣茂

炮四錢

木香

熟

地黃

肉桂

各三錢

紅花

貫衆

蘇木

各一錢

血竭

一錢另研

右十味除血竭外同為細末和勻每服三錢熱酒十錢調下食前忌生冷及當風大小便

和血通經丸治婦人經水凝滯不行腰背膝腹疼痛漸成血瘕

芍藥一兩 木香 當歸 肉桂 乾漆炒烟尽

五靈脂 大黃各半兩 水蛭炒二錢半 廣茂半兩

蜜虫三十箇去頭足翅炒 桃仁二十七箇浸去皮尖

右為末醋糊丸如桐子大每服二十九丸醋湯送下溫酒亦得食前日進一服

朱香礞砂丸治婦人瘕瘕積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不差者

丁香 木香 礞砂研 乾漆炒烟尽 細墨 大

黃銚炒 附子炮 官桂 乳香研 廣茂 青皮

京三稜

沒藥研

巴豆霜

瘦牛

猪牙皂角

炙去皮弦

乾薑

炮各等分

右十六味除另研外同為末以好醋一升化開礪砂去了粗銀銅器內慢火熬次下巴豆霜大黃末熬成膏下煎藥末丸如麻子大每服三十九丸溫酒送下量虛實加減大便利為度

血極膏治婦人乾血氣不可不用也此藥是婦人經水之仙藥也  
大黃一兩為末用醱醋一升熬成膏丸如雞頭大每服一丸熱酒化開臨臥溫服大便利一二行後紅脉自下  
一方治經候閉塞不行亦治乾血氣

斑蝥

二十箇糯米炒

桃仁

五十箇炒

大黃

半兩

右為末糊丸如桐子大溫酒下五丸甚者十九空心服

一法加 蜚虫 半錢 水蛭 一錢

溫服大便利一二行後紅脉自下此藥是婦人經水之仙藥不可不用

雲臺散治婦人室女血氣刺痛不可忍者

官桂 沒藥 雲臺子 良薑 各等分

右為末每服二錢乳香酒調下熱服無時

○崩漏帶下

膠艾湯治衝任虛損月水過多及妊娘胎動不安腹痛下墜

阿膠 川芎 甘草 各二兩 當歸 艾葉 各三

兩 白芍藥 熟地黃 各四兩

右剉每服伍錢水一觥酒六分煎至八分去粗稍熱服空

心食前日三服甚者連夜併服

伏龍肝散治經血崩下

伏龍肝

赤石脂 各一兩

熟地黃

艾葉 微炒 各二兩

甘草

肉桂 各半兩

當歸

乾薑 各三分

川芎 三兩

麥門冬 一兩半

右十味剉每服五錢水一錢半入棗三箇擘破煎至七分

食前溫服

丁香膠艾湯治崩漏走下不止蓋心氣不足勞役過度及飲食不節所得經隔少時其脉二尺俱弦緊而洪按之無力其證自養臍下如水求厚衣被以覆其寒白帶之物多間有惡露水下時有鮮血不止右尺時洪微也屋漏水暴下多者夫如屋漏水者黑物多而赤物少合而成也急弦脉見是寒多洪脉時見乃熱多合而言之急弦者北方寒水多也洪脉時出者命門包絡之



火盛也

阿膠

六分炮

當歸身

一兩一分

生艾末

一錢

川芎

四分

丁香末

四分

熟地黃

四分

白芍

三分

右七味咬咀作一服水伍觥先煎五味作一觥二分去粗

入阿膠再煎至一觥空心食前熱服

柴胡調經湯治經水不止鮮紅項筋急脊骨強腦痛不思飲食

羌活

蒼朮

各一錢

柴胡

七分

藁本

獨活

升麻

各伍分

當歸

葛根

各三分

甘草

炙二分

紅花

少許

右十味咬咀作一服水四觥煎至一觥去粗空心稍熱服

取微汗立止

涼血地黃湯治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮守包絡相火故

血走而崩也

柴胡

防風各三分

黃蘗

知母

黃連

藁

本

川芎

升麻

羌活

各二分

生地黄

當

歸尾

各伍分

黃芩

細辛

甘草

炙

荆芥穗

蔓荊子

各一分

紅花

少許

右十七味咬咀作一服水二觥煎至一觥六通稍熱服空

心食前

益胃升陽湯治血脫益氣切聖人之良法也補胃氣以助生發之

氣故曰陽生陰長用諸甘劑為之先務奪世皆以為補氣殊不知

甘能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之在內穀氣

為寶

白朮

三錢

黃芪

甘草

炙各二錢

人參

一錢半

陳皮

當歸身 各一錢

炒麴 一錢半

柴胡

升麻

生黃芩

各半錢春夏少加秋冬去之

右十味以咀每服三錢或伍錢視食加減之如喫食少已定三錢內更減之不可令勝食氣每服水二盞煎至一盞去粗稍熱服無時

黃芩夏月每服中少加秋冬去之

如腹中痛每服加芍藥三分去皮肉桂少許

如渴或口乾加葛根二分 二分者一分作十分內二分也

升陽藥經湯治經水不止右尺脉按之空虛是氣血俱脫也是大寒之證輕手按之脉數疾卒指弦緊或滿皆陽脫之證陰火亦亡若見熱證於口鼻眼無之或渴此皆陰躁陽欲先去也當溫之舉之升之得之燥之此法當大升浮血氣而切補命門之下

脫也

黃芪

白朮

當歸身

各三錢

柴胡

黨參

防風

羌活

各一錢

獨活

一錢半

川芎

地黃

白芍

甘草

炙

人參

各一兩

細辛

六分

黑附子

炮

皮紙五分

肉桂

五分夏月不用

桃仁

十箇湯浸去皮尖

紅花

少許

右十八味咀咀每服三錢若病勢稍緩當漸七加之至半

兩止每服水三觔煎至一觔去粗空心食前稍熱服

備金散治婦人血崩不止

香附

四兩炒

當歸尾

一兩二錢炒用尾

五靈脂

一兩炒

右為末每服五錢醋調空心服立效

寸金散治婦人子腸下不收

蛇床子

附子

胡荽

紫梢花

各等分

右四味為末每服五七錢用水半碗淋之三一過為效

又方伊祁散

伊祁散

全蝎不以多少為末口噙水鼻內噴之立效

加減四物湯治婦人冷熱不調陰陽不分大小便相反

右用四物湯五錢加益原散二錢半水酒各一觔煎至八

分去粗空心溫服

酒煮當歸丸治癰疔白帶下疰脚氣腰以下如在水雪中以火焙

重上厚綿衣蓋其上猶寒冷不任此寒之極也面白如枯煎之

象肌肉如刀刮削瘦之峻速也小便不止與白帶常流不禁固

自不知覺面白目青如薑菜色目眊上無所見身重如山行步

欬側不能安地腿脚枯細大便秘難口不能言無力之極食飲不下心下痞煩心中懊惱不任其苦面停垢背惡寒此上中下三焦其氣俱虛欲竭嘔噦不止胃虛之極也其脉沉厥緊而虛按之空虛若脉洪大而虛按之無力猶為中寒况按之空虛者乎服此藥忌溫麪油膩生冷毒物

當歸

一兩

長薑

七錢

黑附子

七錢

茴香

半兩炒

右剉如麻豆大以好酒一升半同煮酒乾為度炭火上焙乾為細末後入

玄胡

四錢

全蝎

三錢

柴胡

二錢

木香

黃鹽

升麻

各一錢

丁香

甘草

香練

各五分生用

右為末與前四味末和勻酒糊丸如桐子大每服五七十丸淡醋湯送下空心食前

外陽候溫湯治白帶下陰戶痛控心而急痛身黃皮膚燥身重如  
山前陰中如水冷

柴胡

一升半

白葵花

二升

防風

良薑

郁李仁

甘草

各一升

乾薑

生黃芩

橘皮

各半升

右九味咬咀分作二服水二觔煎至一觔去粗食前稍熱  
服少頃以羹饌壓之

當歸附子湯治赤白帶下臍下冷痛

當歸

二升

附子

乾薑

良薑

各一升

柴胡

七分

升麻

蠲梢

甘草

炙各五分

炒鹽

三分

黃蘗

少

引

右十味為粗末每服五錢水五觔煎至一觔去粗稍熱服  
或為末酒糊丸亦得

桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大寒

肉桂一兩

附子三兩

黃芩生

知母各半兩

不思飲

食加五味子三十箇

煩惱面上麻如虫行乃胃中元氣極虛加黃芪人參各七分

甘草

灸三分升麻五分

右咬咀都作一服水二錢煎至一錢稍熱服食遠

白芍藥散治婦人赤白帶下腹脰疼痛服半月見效

白芍

二兩

乾薑

乾米兩

右二件同為粗末炒黃色碾為細末每服二錢空心溫米

飲湯調下至晚又服

火龍丹治婦人二氣不和赤白帶下

白礬

枯四兩

蛇床子

炒三兩



右為末醋糊丸如雞頭大乾臙脂為衣綿裹內陰中  
。灸婦人崩漏及諸疾

血海二穴乃足太陰脾經在膝臘上內燕白肉際二寸中主女子  
漏下惡血月事不調逆氣脹其脉緩者灸之也可灸三壯  
陰谷二穴乃足少陰腎之經在足內輔骨後大筋下小筋上按之  
應手蜇臘取之主女子如妊娠赤白帶下婦人漏血不止腹脹  
滿不得息小便黃如蠱及治膝痛如錐刺不得屈伸舌縱涎下  
煩逆弱難小腹急引陰痛股內燕痛

會陰一穴在兩陰間主女子不月可灸三壯

氣衝二穴在歸來下臘臘上一寸動脉應手宛中主婦人月水  
不利難產子上衝心痛不得息可灸七壯炷如小麥大

水泉二穴在內踝下主婦人月事不利上即多心下滿目眇也

能遠視腹中痛可灸五壯

氣海一穴在臍下一寸五分主婦人月事不調帶下崩中因產惡露不止繞臍疔痛

帶脉二穴在季脇下一寸八分陷者宛中灸七壯主婦人不月及不調勻赤白帶下氣轉連背引痛不可忍

氣門二穴在臍下三寸兩傍各三寸灸五十壯治婦人產後惡露不止及諸淋注如小麥大

石關二穴在膝下二寸兩傍各五寸灸五十壯主產後兩脇急痛不可忍

陰交一穴在臍下一寸主女子月事不調帶下及產後惡露不止繞臍冷疼灸百壯

關元一穴在臍下三寸主婦人帶下癥瘕因產惡露不止斷產絕

下經冷可灸百壯

足下焦二穴在膝下三寸腓外廉兩筋內牽足取之主乳癰喉痺  
肝腫足跗不收可灸三壯

承漿一穴在唇下灸五壯主婦人卒口噤語音不出風癰之疾  
凡婦人產後氣血俱虛灸臍下一寸至四寸各百壯炷如大麥大  
元氣自生

○中氣不足治驗

佚庵劉尚書第五子太常少卿叔謙之內李氏中統三年春欲歸  
寧父母不得情動於中又因勞役四肢因倦躁熱惡寒時作疼痛  
不欲食上即嘔吐氣弱短促愈隨嗜卧醫作傷寒治之解表發汗  
次日傳變又以大小柴胡之類治之至十餘日之後病證愈劇主  
家云前藥無效莫非他病否醫曰此傷寒六經傳變至再經傳盡

當得汗而愈。翌日見爪甲微青黑色。足脛至腰如冰冷。目上視而  
覩不轉睛。咽噎不利。小腹冷氣。上衝心而痛。嘔吐不止。氣息欲絕。  
召予治之。予診其脉沉細而微。不見傷寒之證。此乃中氣不足。妄  
作傷寒治之。發表攻裏。中氣愈損。壞證明矣。太夫人泣下。避席曰。  
病固危困。君盡心救治。予以辛熱之藥。咬咀一兩。作一服。至夜藥  
熟而不能飲。續灌下一口。飲至半夜。稍有呻吟之聲。身體漸溫。  
忽索粥飲。至旦食粥兩次。又煎一服投之。至日高。發覺至診之。  
曰。脉生證回矣。衆喜而退。後越三日。太夫人曰。病人大便不利。或  
以用脾約丸潤之。可乎。予曰。前證用大辛熱之劑。陽生陰退而愈。  
若以大黃之劑下之。恐寒不協。轉生他證。衆以為不然。遂用脾約  
丸二十九。潤之。至夜下利兩行。翌日面色微青。精神困弱。嘔吐復  
作。予再以辛熱前藥溫之而愈矣。故名曰。

溫中益氣湯

附子

炮去皮臍

乾薑

炮各五錢

草薢

甘草

炙各二錢

益智仁

白芍藥

丁香

白木

各二錢

人

參

陳皮

吳茱萸

各一錢半

當歸

一錢

右十三味咬咀每服五錢水二觔煎至一觔去粗溫服食前病勢大者服一兩重

論曰內經云寒淫於內治以辛熱佐以苦甘溫附子乾薑大辛熱助陽退陰故以為君丁香藿香薢益智慧萸辛熱溫中止吐用以為臣人參當歸白木陳皮白芍藥薤其草苦甘溫補中益氣和血脈協力用以為佐使矣

○臍脹治驗

范郎中夫人中統五年八月二十日先因勞役飲食失節加之憂

思氣結病心腹脹滿旦食則嘔暮不能食兩脇刺痛診其脉弦而細黃帝鍼經五乱篇云清氣在陰濁氣在陽乱於胃中是以大惋內經曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生脹脹此陰陽逆作病之逆從也至夜濁陰之氣當降而不降脹尤甚又云臟寒生滿病大抵陽主運化飲食倦勞損傷脾胃陽氣不能運化中焦聚而不散故為脹滿先灸中脘穴乃胃之募引胃中生發之氣上行次

木香順氣湯治之

蒼朮

吳茱萸

各五分湯洗

木香

厚朴

薑製

陳

皮

薑膏

各三分

當歸

益智仁

白茯苓

去皮

澤瀉

柴胡

青皮

半夏

湯泡

升麻

草豈

薤

各二分麝香

右十五味咀作一服水二服煎至一服去粗稍熟服食  
前忌生冷硬物及怒氣數日良愈

論曰內經云留者行之結者散之以柴胡升麻苦平行少  
陽上明二經發散清氣運行陽分故以為君生姜半夏豆  
蔻益知母甘大溫消散大寒故以為臣厚朴木香蒼木青  
皮辛苦大溫通順滯氣當歸陳皮人參味甘溫調和榮衛  
滋養中氣濁氣不降以苦泄之吳茱萸苦熱泄之者也氣  
之薄者陽中之陰茯苓甘草澤瀉鹹平氣薄引導濁陰之  
氣自天而下故以為佐使也氣味相合散之泄之上之下  
之使清濁之氣各安其位也

○氣治驗

趙運使夫人年五十八歲於至元甲戌三月中病臍腹全疼相引

脇下痛不可忍及後悶亂不得安臥予以當歸四逆湯主之先灸中庭穴

當歸四逆湯治臍腹冷痛相引腰膝而痛

當歸尾 七分

附子炮

官桂

茴香炒

柴胡各五分

芍藥四分

茯苓

玄胡索

川練子各三分酒煮

澤瀉二分

右十味咬咀作一服水二觔半煎至一觔去粗溫服空心食前數服而愈

論曰難經云任之為病內結七疝此寒積所致也內經云寒淫於內治以辛熱佐以苦溫以附子官桂甘辛大熱助陽逐陰用以為君玄胡茴香辛溫除下焦虛寒當歸辛溫和血止痛故以為臣芍藥之酸寒補中焦之氣又防熱藥



損其肝經澤瀉鹹平茯苓甘平去膀胱中留垢川續斷苦  
寒酒煮之止痛又為引用乃在下者引而伸之之意也紫  
胡苦平行其本經故以為使也

中庭一穴在臍中下一寸六分陷者中任脉氣所發可灸五壯鍼  
入三分或灸二十七壯三七壯無妨